

हेपेटाइटिस बी


माँ से नवजात शिशु में संचारण

- सभी गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस बी की जाँच अवश्य करवानी चाहिए।
- हेपेटाइटिस बी से संक्रमित सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव नामित स्वास्थ्य संस्थान में ही कराया जाना चाहिए।

नवजात शिशु


- प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के 24 घंटे के भीतर, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की जन्म खुराक अवश्य दी जानी चाहिए।
- यदि शिशु का जन्म हेपेटाइटिस बी संक्रमित माँ से हुआ है, तो उसे जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की जन्म खुराक के साथ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्युलिन (HBIG) भी दिया जाना चाहिए।

जाँच, वैक्सीन तथा हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्युलिन नामित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध हैं।



एक सुई, एक बार नई सुई, हर बार

असुरक्षित सुई के
प्रयोग से हेपेटाइटिस
सी का संक्रमण हो
सकता है।



हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है और इसका उपचार
नामित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध है।

टैटू बनवाने या शरीर में पियर्सिंग करवाने के बारे में सोच रहे हैं?


सुनिश्चित करें टैटू बनवाने के पहले नई सुई और नई स्याही एवं पियर्सिंग के लिए जीवाणुरहित उपकरणों का प्रयोग करें।



टैटू का शौक,
न बने जीवन का शोक।
सुरक्षित रहें।

रक्त से फैलने वाले संक्रमणों से बचाव करें।

हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है 12 सप्ताह में



रोज़ दवा लें

इसकी जाँच एवं उपचार नामित
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध है।

हेपेटाइटिस बी

माँ से नवजात शिशु में संचारण

- » सभी गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस बी की जाँच अवश्य करवानी चाहिए।
- » हेपेटाइटिस बी से संक्रमित सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव नामित स्वास्थ्य संस्थान में ही कराया जाना चाहिए।

नवजात शिशु

- » प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के 24 घंटे के भीतर, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की जन्म खुराक अवश्य दी जानी चाहिए।
- » यदि शिशु का जन्म हेपेटाइटिस बी संक्रमित माँ से हुआ है, तो उसे जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की जन्म खुराक के साथ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्युलिन (HBIG) भी दिया जाना चाहिए।

जाँच, वैक्सीन तथा हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्युलिन नामित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध हैं।